### **Problem 1**

**(1)** 

证明:

对于事件 A, B,

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B \setminus (AB))) = P(A) + P(B \setminus (AB)) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

n=1 公式显然成立,若 n=k 时成立,则 n=k+1 时有

$$\begin{split} &P((\cup_{i=1}^{k}A_{i})\cup A_{k+1})\\ &=P(\cup_{i=1}^{k}A_{i})+P(A_{k+1})-P((\cup_{i=1}^{k}A_{i})\cap A_{k+1})\\ &=P(A_{k+1})+P(\cup_{i=1}^{k}A_{i})-P(\cup_{i=1}^{k}A_{k}A_{k+1})\\ &=P(A_{k+1})\\ &+\left(\sum_{i=1}^{k}P(A_{i})-\sum_{1\leq i< j\leq k}P(A_{i}A_{j})+\cdots+(-1)^{k+1}A_{1}\ldots A_{k}\right)\\ &-\left(\sum_{i=1}^{k}P(A_{i}A_{k+1})-\sum_{1\leq i< j\leq k}P(A_{i}A_{j}A_{k+1})+\cdots+(-1)^{k+1}A_{1}\ldots A_{k}A_{k+1}\right)\\ &=\left(\sum_{i=1}^{k+1}P(A_{i})-\sum_{1\leq i< j\leq k+1}P(A_{i}A_{j})+\cdots+(-1)^{k+2}A_{1}\ldots A_{k+1}\right) \end{split}$$

由自然归纳法推得对 n 个数, 加法公式成立.  $\square$ 

(2)

证明:

对于事件 A, B,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \le P(A) + P(B)$$

n=1 公式显然成立,若 n=k 时成立,则 n=k+1 时有

$$egin{aligned} &P((\cup_{i=1}^k A_i) \cup A_{k+1}) \ &\leq P(\cup_{i=1}^k A_i) + P(A_{k+1}) \ &\leq \sum_{i=1}^k P(A_i) + P(A_{k+1}) \ &= \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) \end{aligned}$$

由自然归纳法推得对 n 个数, Union Bound 成立.  $\square$ 

(3)

证明:

n=1 显然成立,若 n=k 时成立,则 n=k+1 时有

$$P(A_{k+1}|A_1\dots A_k) = rac{P(A_1\dots A_{k+1})}{P(A_1\dots A_k)} = rac{P(A_1\dots A_{k+1})}{P(A_1)P(A_2|A_1)\dots P(A_k|A_1\dots A_{k-1})}$$

$$\mathbb{P}(A_1)P(A_2|A_1)\dots P(A_{k+1}|A_1\dots A_k) = P(A_1\dots A_{k+1}).$$

### **Problem 2**

**(1)** 

不成立. 令 x,y,z 为  $\in \{0,1\}$  的随机变量,事件 A 为  $x \geq yz$ ,事件 B 为 y=1,事件 C 为 z=0.

于是 P(A|C)=1,  $P(B|C)=\frac{1}{2}$ ,  $P(AB|C)=\frac{1}{2}$ . 故在事件 C 发生时 A,B 独立. 而  $P(A|\bar{C})=\frac{3}{4}$ ,  $P(B|\bar{C})=\frac{1}{2}$ ,  $P(AB|C)=\frac{1}{4}$ . 故在事件  $\bar{C}$  发生时 A,B 不独立.

(2)

不成立. 令 x,y 为  $\in \{0,1\}$  的随机变量,事件 A 为 x=1,事件 B 为 y=1,事件 C 为 x=y.

事件 A 和 B 独立. 而  $P(A|C)=\frac{1}{2}$ ,  $P(B|C)=\frac{1}{2}$ ,  $P(AB|C)=\frac{1}{2}$ . 故事件 C 发生时 A,B 不独立.  $\square$ 

(3)

成立.

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}).$$

由于 
$$P(AB) = P(A)P(B)$$
, 故  $P(A\overline{B}) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$ .  $\square$ 

### **Problem 3**

|x|<1 时

Mark: 直接使用In(1-x)>=-x-x^2即可  $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$   $\geq -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4(1-x)}$ 

故

$$egin{split} \ln P(n,m) &= \sum_{i=1}^{n-1} \ln (1-rac{i}{m}) \ &\geq \sum_{i=1}^{n-1} -rac{i}{m} -rac{i^2}{2m^2} -rac{i^3}{3m^2(m-i)} \ &= -rac{(n-1)n}{2m} - O(rac{n^3}{m^2}) - O(rac{n^4}{m^2(m-n)}) \end{split}$$

在m > 2n时,有 $\ln P(n,m) \ge -rac{(n-1)n}{2m} - O(rac{n^3}{m^2})$ .

由  $\exp(x) \geq 1 + x$  得

$$P(n,m) \geq \exp(-rac{(n-1)n}{2m})\left(1-O(rac{n^3}{m^2})
ight)$$

# **Problem 4**

队伍 A 大小 = k 的概率为  $\frac{1}{n-1}$ .

在队伍大小为 k 的情况下,第一个人在 A 中的概率为  $\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}=\frac{k}{n}.$ 

故在队伍 A 且大小为 k 的概率为  $\frac{k}{(n-1)n}$ . 队伍 B 同理,概率也为  $\frac{k}{(n-1)n}$ .

故总概率为  $\frac{2k}{(n-1)n}$ .

**(2)** 

令 X 为第一个人所在队伍大小为 k 的事件,Y 为第一个人为队长的事件,则  $P(Y|X)=\frac{1}{k}$ ,  $P(X)=\frac{2k}{(n-1)n}$  ,  $P(Y)=\frac{2}{n}$  , 故由贝叶斯公式知

$$P(X|Y) = \frac{P(Y|X)P(X)}{P(Y)} = \frac{\frac{1}{k}\frac{2k}{(n-1)n}}{\frac{2}{n}} = \frac{1}{n-1}$$

### **Problem 5**

 $\Diamond T$  为患者实际患病的事件,X 为至少有一个检测阳性的事件.

故有

$$egin{aligned} P(T) &= p \ P(X) &= p(p_1 + p_2 - p_1 p_2) + (1-p)(q_1 + q_2 - q_1 q_2) \ P(X|T) &= p_1 + p_2 - p_1 p_2 \end{aligned}$$

故由贝叶斯公式知

$$P(T|X) = \frac{p(p_1 + p_2 - p_1 p_2)}{p(p_1 + p_2 - p_1 p_2) + (1 - p)(q_1 + q_2 - q_1 q_2)}$$

# **Problem 6**

**(1)** 

$$P(A_{V,v})=2^{-k}.$$

(2)

$$P(\overline{B_V}) = (1 - 2^{-k})^{n-k}.$$

故 
$$P(B_V) = 1 - (1 - 2^{-k})^{n-k}$$
.

(3)

证明:

即证 
$$P(\overline{C}) \leq \binom{n}{k} (1-2^{-k})^{n-k}$$
.

$$P(\overline{C}) = P(\cup_{V:|V|=k} \overline{B_V}) \leq \sum_{V:|V|=k} P(\overline{B_V}) = inom{n}{k} (1-2^{-k})^{n-k}$$
.  $\Box$ 

只需证明存在 c>0,使得  $n=c\times 2^kk^2$  时,P(C)>0,即

$$\binom{n}{k} (1-2^{-k})^{n-k} < 1$$

 $\binom{n}{k} \leq n^k$ ,故只需

$$n^k (1 - 2^{-k})^{n-k} < 1$$

两侧取 ln 得

$$k \ln n + (n-k) \ln (1-2^{-k}) < 0$$

由于 
$$\ln(1-x)=-x-rac{x^2}{2}-\cdots<-x$$
,故只需

$$k \ln n + (n-k)(-2^{-k}) < 0$$

即

$$(c-\ln 2)k^2-(k2^{-k}+k\ln c+2k\ln k)>0$$

取 c=12345 时不等式显然成立. 故存在  $n=O(k^22^k)$  时题目条件成立.  $\square$